



Központi Laboratóriumi Diagnosztikai Osztály

Osztályvezető főorvos: Dr. Simon Judit

Tel.: 465-1800 / 71-024

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATKÉRŐLAP B-L-2-10
HEMATOLÓGIAI, VÉRALVADÁSI VIZSGÁLATOK

Beteg neve:		Születési ideje:	
Lakcíme:		TAJ-száma: - -	
Anyja neve:		Törzsszáma:	
Fekvőbeteg:	kórterem:	ágy:	Naplószáma:
Beküldő mhely:			Vizsgálatot kérő orvos:
Beküldő orvos:	Psz:		(aláírás, pecsét)
Beutaló dg.:	BNO		Mintavétel ideje:
Beküldő orvos telefonszáma:			
Érkezett:	Térítési kategória: 1 4 6	SÜRGŐSSÉG	

Véralvadási Laboratórium Tel.: 4651-800/72-194

Vérkép Laboratórium Tel.:465-1800/72-197

Megjegyzés:

Gyógyszerek (véralvadás, thrombocyta aggregáció):

VÉRALVADÁS		VÉRALVADÁS		VÉRALVADÁS	
Szűrő vizsgálatok		Thrombophilia-thrombosis ^{1*}		Thrombocyta aggregáció ^{7*, 2*}	
Prothrombin (INR,sec.)	4	Protein C ^{6*}	5	TAG –ASA (terápia)	1,5,9
PTI	4	Protein S ^{4*, 6*}	5	TAG –ADP (terápia)	1,5,9
Thrombin idő	4	AT III ^{4*}	5	TAG-V (vérzékenység)	1,5,9
Fibrinogen	4	LA vizsgálat ^{4*,5*, 8*}	4	TAG-R (vérzékenység, ter. köv.)	1,5,9
Reptiláz idő ^{2*}	4	Homocisztein ^{3*}	7	PFA-200 (vérzékenység szűrő)	1,5
Vérzékenység		D-dimer	5	Multiplate (ADP receptor gátló terápia)	1,8
vWF aktivitás	5	APC rezisztencia	4		
vWF antigén	5				
F II	5	Thrombosis terápia-profilaxis		HEMATOLÓGIA	
F V	5	INR (K vitamin antagonist)	4	Teljes vérkép	1
F VII	5	APTI (heparin)	4	Minőségi vérkép	1
F VIII	5	Anti Xa (LMWH) ^{9*}	4	Reticulocyta	1
F IX	5			Vérsejtsüllyedés	2
F X	5			Vörösvértest ozmotikus rezisztencia	3
F XI	5			Pseudo-trombocitopénia kivizsgálása	1,2,3
F XII	5				
F XIII	5				

Vizsgálat: NEAK elszámolás esetén alapellátó beküldő nem kérheti.

1* Több vizsgálat esetén 3 db 1:9 citrátos cső

2* Megbeszélés alapján

3* Az MTHFR csak ennek a vizsgálatnak kóros eredménye alapján kérhető

4* DOAC (Direkt orális anticoagulánsok FX, FII ellen) a vizsgálatot zavarják.

5* LMWH jelenléte a vizsgálatot zavarhatja

6* K-vitamin antagonisták a PC, PS szintet csökkentik

7* Több TAG vizsgálat esetén 3 db 1:9 citrátos cső

8* >1,5 INR az eredményt befolyásolhatja

9* Mintavétel az utolsó beadást követő 4 óra múlva, ezt követően a laborba történő azonnali szállítás

1	EDTA-s cső	2	1:4 citrátos cső	3	Na-heparinos cső gél nélkül	4	1 db 1:9 citrátos cső (3,2 %, 4,5 ml)
5	2db 1:9 citrátos cső (3,2%, 4,5 ml)	6	3 db 1:9 citrátos cső (3,2 %, 4,5 ml)	7	CTAD cső	8	Hirudinos cső
9	Mintavétel helyben	10	Ujjbegyes kenet				